



Dierenkliniek Borgstee

Borgstee 28

9403 TV Assen

www.dierenkliniekborgstee.nl

info@dierenkliniekborgstee.nl

Goed voorbereid op reis. Buitenland, kennel of thuis?

De vakantie staat voor de deur, u wilt er lekker tussenuit. Maar u kunt pas echt ontspannen op reis als u weet dat uw huisdier goed is beschermd. Dat geldt voor het buitenland, maar ook voor een verblijf in een kennel of pension. Vanaf 3 juli 2004 gelden voor het vervoer van honden, katten en fretten binnen de Europese Unie een aantal algemene regels.

- De dieren moeten in het bezit zijn van een paspoort volgens Europees model
- De dieren moeten gevaccineerd zijn tegen Rabiës
- De dieren moeten geïdentificeerd zijn.

EU-paspoort

Het paspoort vervangt vanaf 3 juli 2004 alle in Nederland reeds bestaande reisdocumenten die gebruikt worden voor het vervoer van dieren naar het buitenland. De oude paspoorten hoeven niet ingenomen te worden. De nog geldige vaccinaties en behandelingen kunnen schriftelijk overgezet worden door uw dierenarts in het nieuwe paspoort. Het is verstandig het oude vaccinatieboekje te bewaren.

Vaccinatie tegen Rabiës

Het dier moet gevaccineerd zijn tegen Rabiës met een in Nederland geregistreerd vaccin volgens het vaccinatieschema van de producent. Bij de meeste EU landen wordt geadviseerd uiterlijk 21 dagen voor vertrek tegen rabiës te vaccineren.

Hondsdolheid is een reëel gevaar, dat u niet mag onderschatten. Uw huisdier moet daarom worden ingeënt, ook al omdat het zonder geldig bewijs van inenting niet naar het buitenland mag. In verschillende landen worden zeer uiteenlopende voorwaarden aan de inenting verbonden, bijvoorbeeld over het tijdstip van de vaccinatie en eventuele bloedtesten voorafgaand aan de reis.

Identificatie

Een identificatie is verplicht. Dit kan door middel van een microchip of een tatoeage. Het nummer van de microchip of de tatoeage moet in het paspoort worden vastgelegd. Naast een identificatie en vastlegging daarvan in het paspoort is een registratie van het chipnummer bij een centrale databank aan te bevelen.

Registratie duurt enkele minuten en werkt wereldwijd!

Kennelhoest vaccinatie

Kennelhoest is een keel- en luchtpijpontsteking, met als belangrijkste verschijnsel: een droge, harde hoest. Het hoesten kan in de loop van enkele weken vanzelf over gaan, maar er kunnen ook complicaties optreden zoals bronchitis of longontsteking. De keel- en luchtpijpontsteking kan ook chronisch worden en is dan moeilijk te genezen. Van meer dan één virus is bekend dat het luchtwegontstekingen kan veroorzaken of de hond gevoeliger kan maken voor de belangrijkste bacterie die bij kennelhoest een rol speelt.

De meest voorkomende verwekkers van kennelhoest zijn een Para-Influenzavirus en Bordetella bronchiseptica bacterie.

Verminderde weerstand, stress, veel blaffen of een hogere infectiedruk (veel honden bij elkaar waarvan meerdere de aandoening hebben) verhogen de kans op verspreiding en aanslaan van de infectie.

De naam kennelhoest is dan ook ontstaan doordat de ziekte zich vooral laat zien op plaatsen waar veel honden dicht bij elkaar leven, zoals bijvoorbeeld in een pension het geval is.

Het is mogelijk om door vaccinatie de hond te beschermen tegen de beide verwekkers van kennelhoest.

Bescherming tegen teken, vlooien en wormen

Babesiosis

Deze ziekte kan worden overgebracht door een teek. Na een tekenbeet kan de parasiet “Babesia”, in de bloedbaan komen. Hij gaat in de rode bloedcellen zitten en maakt deze kapot. Hierdoor kan koorts, bloedarmoede, geelzucht en lusteloosheid ontstaan.

Er kan tegen Babesia ingeënt worden, voor specifieke informatie hierover kunt u de assistente vragen.

Belangrijk is ook tegen teken te beschermen. Dit houdt niet alleen in: een goede halsband (scalibor) of spray/spot-on (frontline) in, maar ook het dagelijks controleren van teken.

Teken kunnen worden verwijderd door ze voorzichtig met een tekenhaak/tang eruit te draaien. **GEBRUIK GEEN ALCOHOL!!** Hierdoor zal de teek juist zijn inhoud “overgeven” in uw hond.

Leishmaniasis

Deze ziekte wordt overgebracht door zandvliegjes. Deze kleine vliegjes komen niet op stranden voor maar juist in tuinen en parken waar veel begroeiing aanwezig is. Overdag verschuilen ze zich in spleten en kieren van muren in een vochtige omgeving (beek, put, fontein etc.) en liefst in de buurt van beboste delen van steden, zoals tuinen en parken. Ook worden ze in woonruimten aangetroffen.

De symptomen kunnen ontstaan tussen maanden en jaren na een beet van het vliegje. Ze worden mager ondanks goede eetlust.

Zandvliegen komen - van mei tot september/oktober - vlak na zonsondergang tevoorschijn en blijven actief tot zonsopgang. Ze houden van warme nachten en kunnen, omdat ze klein zijn, bij harde wind niet vliegen.

U kunt uw hond niet inenten tegen leishmania. U kunt hem alleen beschermen tegen zandvliegjes, het middel wat u hiervoor kan gebruiken is de Scalibor tekenband: deze is werkzaam tegen zandvliegjes en teken.

Hartworm

Deze worm wordt overgebracht door muggen. De muggen komen voor waar de temperatuur niet onder de 15 graden komt. De worm gaat in de bloedbaan zitten. Hierdoor wordt de bloeddorstrooming belemmerd en ontstaan onder andere hartlijden, functie verlies van nieren en lever. U kunt uw dier beschermen door hem Milbemax te geven. Dit is een wormmiddel, dat werkzaam is tegen hartworm en maag-darmwormen. Het behandelingsschema is als volgt: bij aankomst op vakantie 1 tablet geven. Daarna moet er om de 3 weken 1 tablet worden gegeven en bij thuiskomst als laatste.

Vossenlintworm

Deze komt in grote delen van de wereld voor, inclusief Europa. De lintworm heeft een primaire stadium in een ander dier. Honden en katten worden pas geïnfecteerd als ze hiermee besmette knaagdieren vangen of opeten. De vossenlintworm is niet echt schadelijk voor uw hond of kat, maar het primaire stadium kan zich bij mensen in verschillende organen (o.a. Lever, longen) nestelen en zo ziekte veroorzaken. Als u naar een gebied gaat waar de vossenlintworm voorkomt, is het daarom toch belangrijk om infecties te voorkomen en uw hond of kat preventie te behandelen met bijvoorbeeld Milbemax.

Vlooien

Vlooienbeten kunnen erge jeuk veroorzaken bij uw huisdier en soms ook bij de mens. Daardoor gaat uw huisdier zich krabben en bijten. Dit kan zelfs tot wonden leiden. Sommige honden en of katten vertonen allergische reacties op een vlooienbeet. Doordat vlooien zich met bloed voeden kunnen ze bloedarmoede veroorzaken bij jonge en/of verzwakte dieren. Vlooien kunnen een lintworm besmetting doorgeven aan uw huisdier en mogelijk ook aan uw kinderen. Vlooien spelen ook een belangrijke rol in de overdracht van kattenkrabziekte waarbij de kat de mens kan infecteren. Belangrijk is dus dat u uw huisdier het hele jaar door beschermd tegen vlooien. Ook is het verstandig om 4 keer per jaar uw huisdier preventief te ontwormen.

Vaak wordt er in de vakantie periode meer aan de alle bovengenoemde zaken gedacht maar het is verstandig om het hele jaar door aan de bescherming van uw huisdier te denken!!